

Rapport succinct sur l'évaluation préopératoire de l'anesthésie

Objet : Monsieur/Madame

Intervention prévue:

(autocollant du patient)

Date de l'opération:

Opérateur:

Chère collègue, cher collègue

Pour votre patient(e) susmentionné(e), une intervention chirurgicale ambulatoire est prévue à l'**AOP Medin au Lac, Bienne**. Afin de pouvoir réaliser une anesthésie sûre et de déterminer la procédure appropriée, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes ou de procéder à des clarifications. Si, lors de l'examen ou de l'anamnèse, des indices laissent penser qu'une intervention ambulatoire comporte des risques élevés ou n'est pas possible pour des raisons sociales, veuillez-nous en informer à temps.

Merci d'envoyer le formulaire complété à medinaulac@szb-chb.ch

Patient en bonne santé de moins de 60 ans:

Uniquement le questionnaire patient "Anesthésie", aucun autre examen préalable nécessaire

Patient en bonne santé de plus de 60 ans:

Questionnaire du patient "Anesthésie", rapport succinct du médecin de famille et ECG (datant de moins de 12 mois)

Patient souffrant de maladies systémiques, quel que soit son âge:

Questionnaire patient "Anesthésie", rapport succinct du médecin de famille et rapports spéciaux (cardiologie, pneumologie, néphrologie, etc.), laboratoire (hémogramme, créatinine, électrolytes, Quick/INR, ECG (datant de moins de 12 mois)

Diagnostiques pertinents pour le risque (veuillez les énumérer):

Autres informations anamnestiques importantes (allergies, pacemaker, DAI, problèmes d'anesthésie):

Résultats pathologiques (BD, pouls, état cardiaque et pulmonaire, neurologie):

Médication actuelle:

Laboratoire (si cliniquement indiqué):

Date de prélèvement (ne datant pas de plus de 6 mois)

Hb / Hk		Na / K	
Thromozyten		Kreatinin	
Q / INR		BZ / HbA1c	

ECG (si cliniquement indiqué):

Date

rapport ou envoi

Médecin de famille:

Cachet et signature

Anticoagulation:

En cas d'opération de la cataracte, tous les anticoagulants peuvent être transmis normalement, y compris les NOAK, Plavix, Marcoumar!

Pour toutes les autres opérations, il faut

- si **Marcoumar**: veuillez régler l'INR en dessous de 1,2 / Quick au-dessus de 70%, si nécessaire / au besoin "Bridging»
- **Dabigatran** (Pradaxa), **clopidogrel** (Plavix), **prasugrel** (Efient), **ticagrelor** (Brilique), **etc.**: consulter un cardiologue.
- **NOAK**: si c'est médicalement possible, faire une pause à temps, sinon consulter d'abord l'AOP ou le chirurgien
- **Aspirine** : doit être transmise (exception : demande expresse du chirurgien)

CAVE : DAI (défibrillateur cardiovertteur implantable) : veuillez d'abord nous consulter !

Nous vous remercions cordialement de votre collaboration pour garantir une anesthésie sûre à votre patient à l'AOP Medin au Lac, Bienne.

Dr. med. Sieghard Gerlach

Médecin-responsable

AOP Medin au Lac